



ESTO NO ES SIMPLEMENTE  
PREPARAR EL DESAYUNO.

ES PROGRESO  
REAL.

# No deje que la esquizofrenia lo detenga

## GUÍA PARA PACIENTES Y CUIDADORES

CAPLYTA es un medicamento de venta con receta utilizado para tratar a adultos con esquizofrenia.

### Información importante de seguridad

Los medicamentos como CAPLYTA pueden aumentar el riesgo de muerte en personas de edad avanzada que han perdido el contacto con la realidad (psicosis) debido a la confusión y a la pérdida de memoria (demencia). CAPLYTA no está aprobado para el tratamiento de personas con psicosis relacionada con demencia.

No tome CAPLYTA si es alérgico a alguno de sus componentes. Obtenga ayuda médica de urgencia si está sufriendo una reacción alérgica (p. ej., erupción cutánea, picor, urticaria, hinchazón de la lengua, labios, cara o garganta).

Consulte la [Información importante de seguridad](#) adicional en las páginas 12 y 13.

**CAPLYTA**<sup>®</sup>  
(lumateperone) capsules

## ¿QUÉ ES LA ESQUIZOFRENIA?

La esquizofrenia es una enfermedad mental compleja que puede afectar la forma en que una persona piensa e interactúa con el mundo, pero los síntomas pueden reducirse con el tratamiento y el apoyo adecuados. Como afección crónica, requiere medicamentos durante toda la vida para controlar los síntomas. La esquizofrenia también puede interferir con la capacidad de tener relaciones saludables, lo cual puede afectar la vida familiar y social, incluida la capacidad de ir a la escuela o trabajar.

**Si usted o algún ser querido sufre de esquizofrenia, no están solos.** Aproximadamente 2.4 millones de personas en los Estados Unidos viven con esquizofrenia. En general, la esquizofrenia comienza en la edad adulta temprana. Se piensa que es hereditaria.



**La esquizofrenia es una enfermedad complicada** que puede afectar a diferentes personas de diferentes maneras. Aunque se desconoce la causa física de la esquizofrenia, se cree que los desequilibrios entre sustancias químicas en el cerebro son la causa. Estas sustancias químicas, conocidas como “neurotransmisores,” son la dopamina, la serotonina y el glutamato. La esquizofrenia puede resultar de interacciones anormales entre estos neurotransmisores.


Aunque a veces la esquizofrenia puede parecer aterradora o abrumadora, es importante recordar que hay muchas cosas que puede hacer para reducir el impacto de la esquizofrenia en usted o en sus seres queridos. Hablar con su proveedor de atención médica es el primer paso: cuanto más comparta con este, más podrá ayudarle.

**Millones de personas viven y trabajan con esquizofrenia; es posible un progreso real.** Las siguientes páginas están destinadas a ayudarle a mantener conversaciones más productivas con su proveedor de atención médica, de modo que cada cita se sienta como un avance positivo.

## LOS SÍNTOMAS FRECUENTES DE LA ESQUIZOFRENIA INCLUYEN:

<b>Falta de juicio y de conciencia de la enfermedad</b>	Ser menos capaz de procesar lo que está pasando
<b>Evitación social activa</b>	Desviarse para no hablar o interactuar con otras personas
<b>Delirios</b>	Tener pensamientos o creencias inusuales
<b>Alucinaciones</b>	Oír, ver, oler o sentir cosas que no están allí
<b>Paranoia</b>	Creer que fuerzas invisibles están intentando dañarlo
<b>Falta de espontaneidad/flujo de conversación</b>	Tener dificultad para seguir una conversación
<b>Timidez emocional</b>	No poder mostrar ni compartir sus sentimientos
<b>Pérdida del placer</b>	No querer hacer las cosas que normalmente haría
<b>Indiferencia afectiva</b>	Hablar con voz monótona sin ninguna emoción
<b>Incapacidad para concentrarse</b>	Ser incapaz de concentrarse en tareas ordinarias
<b>Depresión</b>	Tener sentimientos de tristeza, vacío y aislamiento

**Hablar con un proveedor de atención médica es el primer paso: cuanto más comparta con este, más podrá ayudarle.**



Si usted o un ser querido ha experimentado alguno de los síntomas anteriores, hable con su proveedor de atención médica lo antes posible. Él/ella puede ayudar a crear un plan de tratamiento para controlar sus síntomas o los de su ser querido. Su proveedor de atención médica también determinará si sus síntomas son frecuentes o lo suficientemente graves como para justificar un diagnóstico de esquizofrenia.



ESTO NO ES SOLO RETRIBUIR.

ES PROGRESO  
REAL.

## AVANZAR DESPUÉS DE UN DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA

Una vez que usted o alguien que conozca recibe un diagnóstico de esquizofrenia, es probable que un proveedor de atención médica le recete uno o más medicamentos. Estos medicamentos pueden ayudar a controlar los síntomas de la esquizofrenia, aunque no todas las personas responden de la misma manera. Es posible que tenga efectos secundarios por algunos medicamentos, por lo que su proveedor de atención médica puede hacerle probar varios medicamentos diferentes antes de encontrar el que funcione mejor.

Encontrar **el medicamento correcto es importante**, y seguir las indicaciones del proveedor de atención médica puede ayudarle a manejar su esquizofrenia.



Puede ser difícil informar a un proveedor de atención médica o cuidador exactamente sobre cómo se siente, pero es importante que sea lo más sincero posible con este. **Hay muchos medicamentos para la esquizofrenia, por lo tanto, si un efecto secundario le molesta, informe a su proveedor de atención médica. Es posible que le quieran cambiar su medicamento.**



ESTO NO ES SOLO UN CAFÉ

ES PROGRESO  
REAL.

## INFORMACIÓN SOBRE CAPLYTA

### ¿Qué es CAPLYTA?

CAPLYTA es un medicamento de venta con receta aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) para adultos con esquizofrenia.

### Cómo puede ayudar CAPLYTA

En 2 ensayos clínicos, se demostró que CAPLYTA ayuda a controlar los síntomas de la esquizofrenia con una seguridad demostrada. **En ambos ensayos clínicos, CAPLYTA fue significativamente mejor que la pastilla de azúcar (placebo) en el control de los síntomas de la esquizofrenia.** Las personas que tomaban CAPLYTA también mostraron una mejora en la gravedad general de su afección, que se midió mediante una escala de valoración de la esquizofrenia.

### Cómo funciona CAPLYTA

La esquizofrenia es complicada. Aunque se desconoce la forma exacta en que funciona CAPLYTA, se cree que afecta diferentes sustancias químicas de señalización cerebral para ayudar a controlar los síntomas de la esquizofrenia.

Consulte la [Información importante de seguridad](#) adicional, incluido el Recuadro de advertencias, en las páginas 12 y 13.

### Cómo tomar CAPLYTA

CAPLYTA es una cápsula que se toma solo una vez al día, con o sin alimentos. No es necesario ajustar la dosis. Es importante



Cápsula de  
una dosis diaria

que lo tome exactamente como le haya recetado su proveedor de atención médica. Recuerde que puede tardar unas semanas en actuar en su cuerpo. Hable con su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que está tomando, ya que existen algunos riesgos de interacciones farmacológicas.

### CAPLYTA puede causar efectos secundarios graves, como los siguientes:

- **Accidente cerebrovascular (problemas cerebrovasculares)** en personas de edad avanzada con psicosis relacionada con demencia que puede provocar la muerte.
- **Síndrome maligno por neurolépticos (SMN):** fiebre alta, confusión, cambios en la respiración, frecuencia cardíaca y presión arterial, rigidez muscular, y aumento de la sudoración; estos pueden ser síntomas de una afección poco frecuente pero potencialmente mortal. Comuníquese con su proveedor de atención médica o vaya a la sala de emergencias si experimenta signos y síntomas de SMN.

**CAPLYTA**<sup>®</sup>  
(lumateperone) capsules

## QUÉ ESPERAR CON CAPLYTA


Los efectos secundarios más frecuentes de CAPLYTA son somnolencia y sequedad en la boca. Su proveedor de atención médica puede indicarle qué hora del día o de la noche es la mejor para que usted tome CAPLYTA. Siga las instrucciones del proveedor de atención médica sobre cuándo y cómo tomar CAPLYTA.

### ¿La glucosa en sangre, el colesterol o los triglicéridos aumentan cuando se toma CAPLYTA?

En ensayos clínicos, los cambios en la glucosa en sangre, el colesterol, y los triglicéridos en pacientes que tomaban CAPLYTA fueron similares a los de los pacientes que tomaban una pastilla de azúcar.

### ¿Cambiará su peso con CAPLYTA?

En un estudio a largo plazo, los pacientes que tomaron CAPLYTA durante 1 año tuvieron una pérdida de peso promedio de 7 libras.



**CAPLYTA, al igual que otros fármacos usados para tratar la esquizofrenia, puede causar problemas en su metabolismo incluidos niveles altos de azúcar en sangre, diabetes, aumento de los niveles de grasa (colesterol y triglicéridos) en la sangre y aumento de peso.**

Cada fármaco tiene su propio perfil de riesgo específico.

Su proveedor de atención médica debe controlar sus niveles de azúcar y grasas en sangre, y su peso antes de comenzar y durante el tratamiento con CAPLYTA. Los niveles extremadamente altos de azúcar en sangre pueden provocar el coma o la muerte. Informe a su proveedor de atención médica si tiene síntomas de niveles altos de azúcar en sangre, que incluyen sensación de mucha sed, hambre, malestar estomacal, debilidad/cansancio o necesidad de orinar más de lo habitual.



### ¿CAPLYTA tendrá un efecto sobre las hormonas que afectan las características sexuales?

Los pacientes que tomaron CAPLYTA en ensayos clínicos no presentaron un aumento de la prolactina (una hormona que, cuando los niveles son elevados, puede provocar efectos secundarios sexuales, como agrandamiento de las mamas, lactación, disfunción eréctil, reducción del deseo sexual y falta del período).

### ¿Los pacientes que toman CAPLYTA experimentan trastornos del movimiento?

En ensayos clínicos, los trastornos del movimiento fueron poco frecuentes y similares a los de una pastilla de azúcar, y el 6.7 % de los pacientes que tomaban CAPLYTA experimentaron trastornos de movimientos frente al 6.3 % de los pacientes que tomaban una pastilla de azúcar.

Al igual que otros fármacos antipsicóticos, CAPLYTA puede causar movimientos que usted no puede controlar en la cara, la lengua u otras partes del cuerpo. Este puede ser un signo de discinesia tardía. La discinesia tardía es un trastorno del movimiento que puede no desaparecer, incluso si deja de tomar CAPLYTA. La discinesia tardía también puede comenzar después de que deje de tomar CAPLYTA.

Consulte la [Información importante de seguridad](#) adicional, incluido el Recuadro de advertencias, en las páginas 12 y 13.

**CAPLYTA**<sup>®</sup>  
(lumateperone) capsules

## Información importante de seguridad

Los medicamentos como CAPLYTA pueden aumentar el riesgo de muerte en personas de edad avanzada que han perdido el contacto con la realidad (psicosis) debido a la confusión y a la pérdida de memoria (demencia). CAPLYTA no está aprobado para el tratamiento de personas con psicosis relacionada con demencia.

No tome CAPLYTA si es alérgico a alguno de sus componentes. Obtenga ayuda médica de urgencia si está sufriendo una reacción alérgica (p. ej., erupción cutánea, picor, urticaria, hinchazón de la lengua, labios, cara o garganta).

**CAPLYTA puede causar efectos secundarios graves, como los siguientes:**

- **Accidente cerebrovascular (problemas cerebrovasculares)** en personas de edad avanzada con psicosis relacionada con demencia que puede provocar la muerte.
- **Síndrome maligno por neurolépticos (SMN):** fiebre alta, confusión, cambios en la respiración, frecuencia cardíaca y presión arterial, rigidez muscular, y aumento de la sudoración; estos pueden ser síntomas de una afección poco frecuente pero potencialmente mortal. Comuníquese con su proveedor de atención médica o vaya a la sala de emergencias si experimenta signos y síntomas de SMN.
- **Movimientos corporales no controlados (discinesia tardía [DT])** en la cara, la lengua u otras partes del cuerpo. La DT puede no desaparecer, incluso si deja de tomar CAPLYTA. También puede ocurrir después de dejar de tomar CAPLYTA.
- **Problemas con su metabolismo** incluidos niveles altos de azúcar en sangre, diabetes, aumento de los niveles de grasa (colesterol y triglicéridos) en la sangre y aumento de peso. Su proveedor de atención médica debe controlar sus niveles de azúcar y grasas en sangre, y su peso antes de comenzar y durante el tratamiento con CAPLYTA. Los niveles extremadamente altos de azúcar en sangre pueden provocar el coma o la muerte. Llame a su proveedor de atención médica si tiene alguno de los siguientes síntomas de niveles altos de azúcar en sangre: sensación de mucha sed, hambre, malestar estomacal, necesidad de orinar más de lo habitual, debilidad/cansancio o confusión, o si su aliento huele a frutas.
- **Recuento bajo de glóbulos blancos.** Su proveedor de atención médica puede realizarle análisis de sangre durante los primeros meses de tratamiento con CAPLYTA.
- **Disminución de la presión arterial (hipotensión ortostática).** Puede sentirse aturdido, mareado o desmayarse al levantarse demasiado rápido de una posición sentada o acostada.
- **Caídas.** CAPLYTA puede provocarle somnolencia o mareos, puede causar una disminución de la presión arterial al cambiar de posición (hipotensión ortostática) y puede ralentizar el pensamiento y las habilidades motoras; esto puede provocar caídas que pueden causar lesiones óseas u otras lesiones.
- **Ataques (convulsiones).**
- **Somnolencia, sensación de cansancio, dificultad para pensar y para realizar actividades habituales.** Hasta que sepa cómo le afecta CAPLYTA, no conduzca, no opere maquinaria pesada ni realice otras actividades peligrosas.

- **Problemas para controlar la temperatura corporal de modo que sienta demasiado calor.** Evite acalorarse demasiado o deshidratarse mientras esté tomando CAPLYTA.
- **Dificultad para tragar que puede hacer que los alimentos o los líquidos entren en los pulmones.**

Los efectos secundarios más frecuentes de CAPLYTA incluyen somnolencia y sequedad en la boca.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de CAPLYTA. Informe a su proveedor de atención médica si tiene o ha tenido problemas cardíacos o un accidente cerebrovascular, presión alta o baja, diabetes o niveles altos de azúcar en sangre, problemas de colesterol, o tiene o ha tenido ataques (convulsiones), problemas de hígado o riñón o recuento bajo de glóbulos blancos. CAPLYTA puede causar problemas de fertilidad en mujeres y hombres. Debe informar a su proveedor de atención médica si queda embarazada o tiene intención de quedar embarazada mientras toma CAPLYTA. CAPLYTA puede provocar movimientos involuntarios anormales y/o síntomas de abstinencia en recién nacidos expuestos a CAPLYTA durante el tercer trimestre. Hable con su proveedor de atención médica si amamanta o tiene planeado amamantar ya que CAPLYTA pasa a la leche materna. Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que está tomando. CAPLYTA puede afectar la forma en que otros medicamentos funcionan, y otros medicamentos pueden afectar la forma en que CAPLYTA funciona, lo que podría causar efectos secundarios graves. No comience ni deje de tomar ningún medicamento mientras toma CAPLYTA sin consultar con su proveedor de atención médica. Se le anima a notificar los efectos secundarios negativos de los fármacos de venta con receta. Póngase en contacto con Intra-Cellular Therapies, Inc. llamando al [1-888-611-4824](tel:1-888-611-4824) o con la FDA llamando al [1-800-FDA-1088](tel:1-800-FDA-1088) o visitando [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch).

CAPLYTA está disponible en cápsulas de 10.5 mg, 21 mg y 42 mg.

Consulte la [Guía del medicamento](#), incluido el Recuadro de advertencias.




**CAPLYTA**<sup>®</sup>  
(lumateperone) capsules

# SU PRÓXIMA VISITA AL PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA

## Cómo sacar el máximo provecho de su próxima cita con el proveedor de atención médica

Las citas con su proveedor de atención médica son momentos excelentes para informarle sobre cómo van las cosas con sus medicamentos y su vida. También son momentos excelentes para hacer preguntas de cosas sobre las que tiene curiosidad o que le preocupan. Es útil mencionar qué tan bien se están controlando sus síntomas o si tiene problemas con los efectos secundarios.



Estas son algunas preguntas adicionales que pueden resultarle útiles para preguntarle a su proveedor de atención médica:

- ¿CAPLYTA puede ayudar con mis síntomas de esquizofrenia?
- ¿Con qué rapidez comenzará a actuar CAPLYTA?
- ¿Cuáles son los efectos secundarios de CAPLYTA? ¿Son diferentes de otros medicamentos para la esquizofrenia?
- ¿Debo tomar CAPLYTA con alimentos?
- ¿CAPLYTA me hará aumentar de peso?
- ¿Puedo tomar otros medicamentos con CAPLYTA?
- ¿Me sentiré de forma diferente mientras esté en tratamiento con CAPLYTA?
- ¿Cree que CAPLYTA sería adecuado para mí?

**Si aún sigue debatiendo, hable con su proveedor de atención médica sobre la posibilidad de avanzar con CAPLYTA y visite [caplyta.com/schizophrenia](https://caplyta.com/schizophrenia)**

Consulte la [Información importante de seguridad](#) adicional, incluido el Recuadro de advertencias, en las páginas 12 y 13.

## Cosas para hablar con mi proveedor de atención médica:

Tampoco pasa nada si se olvida de preguntar algo durante la cita. Un consejo es llevar una pequeña libreta con usted o tenerla en su casa para usarla cuando piense cualquier cosa que desee preguntar. Luego, puede llevarla a su próxima cita o llamar a su proveedor de atención médica para hablar al respecto.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



**CAPLYTA**  
(lumateperone) capsules



# OFERTA DE AHORROS

Aprenda cómo conseguir su tarjeta de ahorros

LOS PACIENTES ELEGIBLES\* PUEDEN  
**PAGAR TAN SOLO**

**\$0** POR LAS DOS PRIMERAS  
**REPOSICIONES**  
Suministro de hasta 30 días

**\$15** POR LAS REPOSICIONES  
**POSTERIORES DE CAPLYTA**  
Suministro de hasta 90 días

Acceda a su tarjeta de ahorros CAPLYTA por mensaje de texto o escanee el código QR para descargarla de nuestro sitio web.

## 1. ENVÍE UN MENSAJE DE TEXTO CON LA PALABRA “CAPLYTA” AL 26789

para descargar una tarjeta de ahorros digital CAPLYTA a su teléfono y recibir mensajes de texto útiles sobre su prescripción.

- Alertas sobre ahorros en recetas
- Actualizaciones de la cobertura del seguro
- Recordatorios de reposiciones y la opción de pedir las por mensaje de texto

Se pueden aplicar tarifas de mensajes y datos. La frecuencia de los mensajes varía. Envíe HELP (AYUDA) para obtener ayuda. Envíe STOP (DETENER) para finalizar. Consulte los [Términos y Condiciones](#) y la [Política de privacidad](#).

## 2. DESCARGUE LA TARJETA DE AHORROS

Escanee el código QR para descargar e imprimir su tarjeta de ahorros desde nuestro sitio web. A continuación, llévela a su farmacia, enséñesela al farmacéutico y empiece a ahorrar en sus recetas de CAPLYTA.



Consulte la [Información importante de seguridad](#) adicional, incluido el Recuadro de advertencias, en las páginas 12 y 13.

**\*Al utilizar la tarjeta de ahorros de CAPLYTA, usted reconoce que actualmente cumple todos los criterios y términos y condiciones de elegibilidad y que cumplirá con los términos y condiciones que se indican a continuación.**

### CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DEL PROGRAMA Y TÉRMINOS Y CONDICIONES:

Esta oferta es válida para pacientes nuevos o existentes elegibles que surtan una receta de CAPLYTA.

Los pacientes deben tener 18 años de edad o más, ser residentes de los Estados Unidos excluyendo Puerto Rico, y poseer una receta válida de CAPLYTA.

Los pacientes deben tener un seguro comercial privado. La oferta **no** es válida para las recetas reembolsadas en virtud de Medicaid, un plan de beneficios de fármacos de Medicare, TRICARE, u otros programas de salud federales o estatales (como programas de asistencia médica). Esta oferta no es un seguro, no tiene valor en efectivo y no puede utilizarse en combinación con ningún otro descuento, cupón, reembolso, prueba gratuita, ahorro u otra oferta similar.

Esta tarjeta de ahorros no es válida cuando todo el costo de su medicamento con receta es elegible para ser reembolsado por su plan de seguro privado u otros programas de beneficios farmacéuticos o de salud privados. Debe deducir el valor de esta tarjeta de ahorros de cualquier solicitud de reembolso presentada a su plan de seguro privado, ya sea directamente por usted o en su nombre. Usted es responsable de notificar el uso de la tarjeta de ahorros a cualquier aseguradora comercial privada, plan de salud u otro tercero que pague o reembolse cualquier parte de la prescripción suministrada mediante la tarjeta de ahorros, según sea necesario. No debe utilizar la tarjeta de ahorros si su aseguradora o plan de salud prohíbe el uso de las tarjetas de ahorros de fabricantes.

Esta oferta solo es válida en farmacias minoristas participantes. Esta tarjeta no se puede canjear por dinero en efectivo. Sin efecto si está prohibido por ley, es gravable o tiene restricciones. Los pacientes elegibles pueden pagar tan solo \$0 en los dos primeros suministros, hasta el beneficio máximo de por vida basado en el precio de lista actual de suministro de 30 días. En usos posteriores, los pacientes elegibles pueden pagar tan solo \$15, hasta el beneficio máximo de \$600. Beneficio del programa calculado a partir de la dosificación aprobada por la FDA.

Se requiere un n.º de ID de prescriptor válido en la prescripción. Intra-Cellular Therapies se reserva el derecho de rescindir, revocar o modificar esta oferta en cualquier momento y sin previo aviso.

**Los datos relacionados con el reembolso de esta tarjeta de ahorros pueden recopilarse, analizarse y compartirse con Intra-Cellular Therapies para la investigación de mercado y/u otros fines relacionados con la evaluación del programa de ahorros CAPLYTA.**

Al usar esta oferta, usted autoriza que el programa de ahorros CAPLYTA comparta su información de prescripción con CoverMyMeds para que CoverMyMeds pueda contactar a su proveedor de atención médica para solicitarle que envíe información para respaldar la cobertura de su prescripción de CAPLYTA por parte de su plan de seguro de salud.

Este programa es válido hasta el 04/30/2025.

No es necesaria ninguna otra compra.

Intra-Cellular Therapies se reserva el derecho de rescindir, revocar o modificar esta oferta sin previo aviso.

Los pacientes con preguntas sobre la tarjeta de ahorros CAPLYTA deben llamar al [1-800-639-4047](tel:1-800-639-4047).

**Farmacéutico: cuando aplica esta oferta, usted certifica que no ha presentado una solicitud de reembolso bajo ningún programa federal, estatal u otro programa gubernamental para esta prescripción.** Esta oferta solo es válida para pacientes con seguro comercial. La participación en este programa debe cumplir con todas las leyes y normativas aplicables como proveedor de farmacia.

**Al participar en este programa, usted certifica que cumplirá con los términos y condiciones descritos en la sección Restricciones a continuación.**

**Instrucciones para el farmacéutico de un paciente con un tercero elegible:** envíe la reclamación al pagador principal de terceros primero, luego envíe el saldo adeudado a **Change Healthcare** como pagador secundario como facturación solo con copago utilizando otro código de cobertura válido. Los pacientes elegibles pueden pagar tan solo \$0 en los dos primeros usos, hasta el beneficio máximo de por vida basado en el precio de lista actual de suministro de 30 días. En usos posteriores, los pacientes elegibles pueden pagar tan solo \$15, hasta el beneficio máximo de \$600. El reembolso se recibirá de **Change Healthcare**.

Para cualquier pregunta relacionada con el procesamiento en línea de **Change Healthcare**, llame al Servicio de asistencia técnica al [1-800-433-4893](tel:1-800-433-4893).

**Restricciones:** esta oferta es válida en los Estados Unidos, excepto Puerto Rico. La oferta no es válida para las recetas reembolsadas bajo Medicaid, un plan de beneficios farmacológicos de Medicare, TRICARE u otros programas de salud federales o estatales (como programas de asistencia médica). Esta oferta solo es válida para pacientes con seguro comercial. Las tarjetas de descuento en efectivo y otros planes no seguros no son válidos como principales en virtud de esta oferta. Si el paciente es elegible para recibir beneficios farmacológicos en cualquiera de estos programas, no podrá utilizar esta oferta. **Al utilizar esta oferta, el paciente certifica que cumplirá con cualquier término de su contrato de seguro médico que requiera una notificación a su pagador de la existencia y/o valor de esta oferta.** Es ilegal vender, comprar o negociar esta oferta (u ofrecer hacerlo). El programa caduca el 04/30/2025. Esta oferta no es transferible y se limita a una oferta por persona. No es válida si se reproduce.

Sin efecto cuando lo prohíba la ley. Programa gestionado por ConnectiveRx en nombre de Intra-Cellular Therapies.

Intra-Cellular Therapies se reserva el derecho de rescindir, revocar o modificar esta oferta sin previo aviso en cualquier momento.

**CAPLYTA**  
(lumateperone) capsules

## OTROS RECURSOS Y APOYO ÚTILES

Existen muchas organizaciones que pueden ayudar a las personas con esquizofrenia a establecer relaciones importantes con los demás.

### **Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales (National Alliance on Mental Illness, NAMI)**

NAMI es una organización dedicada a construir mejores vidas para los millones de estadounidenses con enfermedades mentales.

Sitio web: [nami.org](http://nami.org)

### **Instituto Nacional de la Salud Mental (National Institute of Mental Health, NIMH)**

El Instituto Nacional de la Salud Mental es el organismo federal principal para la investigación sobre trastornos mentales.

Sitio web: [nimh.nih.gov](http://nimh.nih.gov)

### **988 Línea de asistencia para la prevención del suicidio y ayuda ante crisis**

Si alguna vez tiene pensamientos suicidas, o simplemente necesita hablar con alguien, las personas están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y están listas para ayudarlo. También puede conversar en línea con un especialista.

Sitio web: [suicidepreventionlifeline.org](http://suicidepreventionlifeline.org)

Teléfono: [1-800-273-8255](tel:1-800-273-8255)

### **Salud Mental de América (Mental Health America, MHA)**

Salud Mental de América es una organización comunitaria sin fines de lucro dedicada a abordar las necesidades de las personas con enfermedad mental.

Sitio web: [mhanational.org](http://mhanational.org)

### **Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU.**

Es responsabilidad del Departamento de Salud y Servicios Humanos (Health & Human Services, HHS) de los EE. UU. mejorar y proteger la salud y el bienestar de todos los estadounidenses.

Sitio web: [hhs.gov](http://hhs.gov)

### **Fundación Estadounidense para Prevención del Suicidio (American Foundation for Suicide Prevention, AFSP)**

La AFSP fomenta la concienciación, financia la investigación científica y proporciona recursos y ayuda a los afectados por el suicidio.

Sitio web: [afsp.org](http://afsp.org)

Consulte la [Información importante de seguridad](#), incluido el Recuadro de advertencias, en las páginas 12 y 13.

**CAPLYTA**   
(lumateperone) capsules